

CÉPAGES DIT « MODESTES »



Une mémoire


- ▣ Avant de commencer je voudrais remercier , devant vous , deux personnes a qui nous devons beaucoup Marcel Durquety de l'INRA de Bordeaux et Guy Lavignac de l'ONIVINS., avec eux leurs collègues Louis Bordenave et Marc Hevin ainsi que Alain Cottet et Breuil . La recherche des cépages anciens et leur mises en place dans les conservatoires , n'auraient pu se faire sans eux. JM Boursiquot, Thierry Lacombe Olivier Yobregat leurs ont succédés avec bonheur.

Nos viticulteurs

Et surtout un grand merci à tous ces viticulteurs , qui nous ont aidé dans notre démarche de recherche . De Tarbes aux Aldudes, de Saint -Etienne de Baïgorry à Maumusson et même en Uruguay et dans les secteur de Roncevalles .

Cépages du Jurançonnais

Ahumat, Arrouya, Arrufiac , Ardounet ,
Baroque , Blandame, Bouchy , Cabernet
franc , Caillabas, Camaralet, Camaraou
R, Camaraou B, Camobrac, Claverie ,
Coe de Baco , Courbu , Courbu noir,,
Courtoisie , Cruchen, Fer , Gros
Manseng ,Lauzet, Lercat, Manseng Vert,
Mansengou, Manseng Noir,, Gras, Petit
Manseng, Petit Courbu ,Président,
Printiù Aigut ,Raffiat de Moncade ,
Trouchet,



PROSPECTIONS



11/11/2017

PB

7

PROSPECTIONS avec Marcel DURQUETY

DOMAINE
MONDINAT
À GAN



Conservatoire cépages blancs de Franqueville

Conservatoire Cépages Blancs et Collection Raffiat de Moncade

	Rang 1	Rang 2	Rang 3	Rang 4	Rang 5	Rang 6	Rang 7
BLOC 1	Inconnu ORTHEZ 6-3 5 5 CAMARAOU Femelle	Inconnu ORTHEZ 6-4 5 ARROUYA	Gros Manseng Meunier Vassal 377-1 5	Inconnu ORTHEZ 7-4 5 ARROUYA	Inconnu MONCADE 7-12 5 FOLLE BLANCHE	Inconnu Casi con 12 5 k	Humagne blanc Vassal 0-1422 5 plantation 16/5/13
BLOC 2	RAFFIAT DE MONCADE B Entav 0014 5 k	RAFFIAT DE MONCADE B Entav 0013 5 k	RAFFIAT DE MONCADE B Entav 0012 5 k	Raffiat de Moncade ORTHEZ INRA 33 465 5 k	Raffiat de Moncade INRA 33 5/11-15 5 k	Raffiat de Moncade coustille, Lembe LL 3-47 5 k	Humagne blanc Vassal 0-1679 5 plantation 16/5/13
BLOC 3	Raffiat de Moncade INRA 33 5/11-15 5 k	Raffiat coustille, Lembe LL 3-47 5 k	RAFFIAT DE MONCADE B Entav 0014 5 k	RAFFIAT DE MONCADE B Entav 0013 5 k	RAFFIAT DE MONCADE B Entav 0012 5 k	Raffiat de Moncade ORTHEZ 465 5 k	Humagne blanc Vassal 0-1511 5 plantation 16/5/13
BLOC 4	RAFFIAT DE MONCADE B Entav 0012 5 k	Raffiat de Moncade ORTHEZ 465 5 k	Raffiat de Moncade INRA 33 5/11-15 5 k	Raffiat coustille, Lembe LL 3-47 5 k	RAFFIAT DE MONCADE B Entav 0014 5 k	RAFFIAT DE MONCADE B Entav 0013 5 k	Humagne blanc Vassal 0-544 5 plantation 16/5/13
BLOC 5	LAUZET B Entav 0017 5 k	LAUZET B Entav 0015 5 k	LAUZET B Entav 0012 5 k	LAUZET B Entav 0016 5 k	Lauzet INRA 33 0016 5 k	Manseng Vert INRA 33 15 k	Humagne blanc Vassal 407-3 5 plantation 16/5/13
BLOC 6	Lauzet INRA 33 0017 5 k	LAUZET B Entav 0017 5 k	LAUZET B Entav 0015 5 k	LAUZET B Entav 0012 5 k	LAUZET B Entav 0016 5 k	k k k	Clavier Coulard Vassal 0-1656 5 plantation 16/5/13
BLOC 7	LAUZET B Entav 0016 5 k	Lauzet INRA 33 5 k	LAUZET B Entav 0017 5 k	LAUZET B Entav 0015 5 k	LAUZET B Entav 0012 5 k	k k k	Clavier Coulard Vassal 0-1443(1423?) 5 plantation 16/5/13
BLOC 8	Lercat MONCADE 17-36 5 k Profil INCONNU	Camarau Blanc INRA 33 38-10 5 k	Camarau Blanc MONCADE 37-19 10 k	Lillorita CA 11 5 p	Lillorita CA 11 5 p	Hegoa CA 11 10 p	Clavier Coulard Vassal 1217-1 5 plantation 16/5/13
BLOC 9	Lercat MONCADE 20-48 5 k COURBU B	k k k k	<i>entre 1/11/12 1/1/13</i> k k	Hegoa CA 11 5 p	Lillorita CA 11 5 p	k k k	Béguignol Vassal 338-1 5 plantation 16/5/13
BLOC 10	Lercat INRA 33 4/21-25 5 k	k k k k	Coe de baco MONCADE 12-3 3 k	Hegoa CA 11 5 p	Hegoa CA 11 5 p	Lillorita CA 11 5 p	EA 10 5 plantation 16/5/13
BLOC 11	Grasse INRA 33 11-7 10 k k k k k	Clavier ORTHEZ 11-7 5 CAMARAOU Femelle Clavier INRA 33 3/26-30 5 k	PÉDAUQUE INRA 33 4/56-60 10 k k k k	miousat INRA 33 4/41-45 10 k k k k	Alouat MONCADE 9-79 10 k k k	Mansengou MONCADE 8-8 5 k k k	GA 10 5 plantation 16/5/13
BLOC 12	k k k k k	k k k k k	k k k k k	k k k k k	k k k k SAUVIGNON B	Blanc Dame coustille, Lembe LL 1-1 5 k CLAIRETTE	Lercat Vassal 404-1 5 plantation 16/5/13
BLOC 13	Blanc Dame INRA 33 10 k k k k	Blanc Dame ORTHEZ 9-8 5 CHASSELAS Printillou aigut MONCADE 6/110 5 k	Printu MONCADE 5 k	Pé de Perdrix INRA 33 5 k	PÉDAUQUE INRA 33 4/56-60 5 k	Blanc Dame INRA 33 5 k	Lercat Vassal 0-1445 5 plantation 16/5/13
BLOC 14	k k k k	Printillou aigut MONCADE 6/110 5 k	Pédaque Arouses Lasseube R3 s16 10 plantation le 6/4/2011	Pé de Perdrix Vassal 0-688 5 plantation le 16/5/2013	Lercat INRA 33 4/21-25 10 k	LAUZET B Entav 0017 5 k	Courtoise Vassal 407-2 5 plantation 16/5/13
BLOC 15	PENOUILLE Entav 0001 5 7 k miousat INRA 33 4/41-45 7 k k k	Manseng Vert Lazories Lasseube RB s47 plantation le 6/4/2011 k	PENOUILLE	Grasse INRA 33 5 k	k k k k	Inconnu ORTHEZ 7-4 6 k	Pé de Perdrix Vassal 426-1 5 plantation 16/5/13
BLOC 16	4/41-45 7 k k k	Hegoa CA 11 14 p	Meisier Saint François Vassal 0-1321 9 plantation le 16/5/2013	Inconnu Arouses Lasseube R3 s16 11 plantation le 6/4/2011	Petit Courbu Duisse 20-5 (3p) plantation le 6/4/2011 Petit Courbu Duisse 7-4 (3p) plantation le 6/4/2011 Petit Courbu Duisse 7-3 (3p) plantation le 6/4/2011	Blanc Dame Vassal 0-543 7 plantation 16/5/2013 <i>Duisse 7-3</i>	Biancard Vassal 392-3 5 plantation 16/5/13 Blanc Dame Vassal 0-1431.2p
BLOC 17				CROUCHEN k			
BLOC 18	Hegoa CA 11 8 p						
BLOC 19							

A donner x Crouchen - Planteur Paris

Le groupe du Gros Manseng

Ce groupe comprend le Gros Manseng, le Gros Manseng de Lucq, le Manseng vert et le Petit Manseng. Ces variétés sont toutes à baies blanches et constituent la base des vins blancs des Pyrénées, du Béarn et de la Gascogne. Génétiquement, ces cépages se situent dans la continuité de ceux appartenant aux groupes du Courbu et du Camaraou noir.

Cépage	Nom d'introduction en collection (Bordeaux ou Montpellier)	Provenance (département)
Gros Manseng B*	Gros Manseng (Bdx-Mtp)	Latresne (Fr 33)
Gros Manseng de Lucq B	Manseng supérieur (Mtp)	Monein (Fr 64)
Manseng vert B	Mansenc vert (Mtp)	Gan (Fr 64)
Petit Manseng B*	Petit Mansenc (Mtp)	Lembeye (Fr 64)

Ce cépage peut aller de 60 à 200 hls , suivant la conduite. De 12° à 15°, fruité agrumes puis fruits exotiques. Belle structure assise sur une bonne acidité

GROS MANSENG



Bien installé dans le Val d'Adour

Gros Mansengs Blancs

▣ Les Mansengs Verts

- ▣ Bourgeonnement jaune-vert , feuille luisante , denture plus fine

▣ Le Gros Manseng de Lucq

- ▣ Variété assez proche de la précédente, mais de qualité supérieur. Lien possible avec le Cabernet Franc.

▣ le Gros Manseng Meunier

- ▣ Forte pilosité bourgeonnement duveteux
- ▣ **Le MANS (le Manoir, maison du maitre) a donné son nom aux Mansengs.**

Comportement

- ▣ Végétatif : assez résistant aux maladies et notamment à la pourriture, il est vigoureux sur SO4 et 3309 C plus calme sur Riparia et 101-14
- ▣ Il atteint en moyenne 13 ° et peut aller plus loin. Acidité finale 7-7.5 . Rendements élevés si on lui en laisse l'occasion .
- ▣ Il donne des secs frais , élégants avec une belle structure. Les moelleux sont moins performants que ceux du Petit Manseng.

Petit Manseng



Caractéristiques

- ▣ Cépage débourrement précoce très vigoureux les rameaux peuvent atteindre 6-7 mètres de long.
- ▣ Palissage en Hautin autrefois il est conduit aujourd'hui en palissage de 2 m 50 et taillé en guyot simple ou double en arcure, planté entre 90cms et 110-120 sur le rang.
- ▣ Grappes petites et baies très petites (100 baies = 85 grs) très résistantes à la pourriture grise.
- ▣ Maturité 3ieme époque

Le Petit Manseng

Gros et Petit sont de deux types différents d'un même cépage-population. Il possède un potentiel élevé en sucre et donc directement destiné aux moelleux .

Bien qu'essentiellement pyrénéen , il a quelques liens génétique avec le Savagnin.

Vendanges du 2/11/2017 :

D° = 20 ° acidité : 7.5

Cépage préféré des Jurançonnais.

Il a une autre forme : le MANSENGOU



11/11/2017
PETIT MANSENG

Feuilles Petit Manseng



classique



Mansengou

Grappes de Petit Manseng



Les Courbus blancs et Noirs

Le groupe du Courbu

Ce groupe (Courbu, Courbu noir, Gros Courbu, Lauzet et Petit Courbu) comprend surtout des variétés à baies blanches (localement, l'ensemble du groupe Courbu est appelé *Courbis*). Génétiquement, ce groupe apparaît moins bien individualisé que le précédent et s'inscrit dans un certain continuum avec les groupes du Gros Manseng et du Camaraou noir.

Cépage	Nom d'introduction en collection (Bordeaux ou Montpellier)	Provenance (département)
Courbu B*	Courbu blanc (Bdx)	Belloc (Fr 64)
	Courbut (Mtp)	Lembeye (Fr 64)
	Courbu gros (Bdx)	Bellocq (Fr 64)
	Rouffiac femelle (Mtp)	(Fr 64)
Courbu noir N*	Courbu rouge (Bdx)	Belloc (Fr 64)
	Courbu rouge (Mtp)	Gan (Fr 64)
	Ardonnet (Mtp)	Lasseube (Fr 64)
Gros Courbu B	Courbu gros (Bdx-Mtp)	(Fr 64)
Lauzet B*	Lauzet (Mtp)	Parbayse (Fr 64)
Petit Courbu B*	Petit Courbu (Bdx)	Gan (Fr 64)
	Petit Courbut blanc (Mtp)	Lasseube (Fr 64)

Courbu blanc ou Gros Courbu (t)




Cépage typique du Jurançon , certains vignerons faisaient des vins de courbu uniquement . Bourgeonnement très bronzé. Feuilles adultes grandes , bullées tourmentées. Sinus petiolaire à bords chevauchant . Nervures rougeâtres. Dents larges et courtes. Débourrement : 7 jours après le chasselas.

Maturité : 2^{ie} époque
Sensible à la pourriture



Rendement 50-60
hls

Degré : 13 - 14
Acidité faible : 3.5-4
Grappes petites ,
baies moyennes
(100 baies = 125



Semble avoir un
regain d'intérêt
auprès des vignerons

Petit Courbu



PETIT COURBU

Cépage autochtone , il est resté présent sur tout le département .

Bourgeonnement très vélu , poils couchés. Feuilles adultes petites , épaisses et structurées sinus latéraux bien marqués , le petiolaire en u et bord chevauchant, forte pigmentation des nervures.

Degré entre 14 et 15
Acidité 4.5 -5
Très aromatiques en fruits exotiques puis confit clémentine et agrumes .



Lauzet

Ce cépage de l'A.O.C de Jurançon est naturellement établi sur tout le secteur.

Il débourre 5 jours après le chasselas, il est de la 3ième époque. Demande une conduite longue en hautin

Il pourrait faire le lien avec le groupe du Tannat.

Son degré alcoolique est assez élevé 14.8-15°. rendement 35/40 hls /ha . .

Il donne des vins secs assez riches en aromes épicés, pierre à fusil.



COURBU(T) ROUGE

Parcelle Mondinat Gan Rg 17 P1:

Bourgeonnement moyen, cotonneux blanc, a liseré rose.

Jeune feuille :

-du haut : en gouttière, cotonneux blanc a légèrement bronzée face supérieure.

-Du bas : d: aranéeux à plage bronzé

-A cotonneux blanc avec plages roses

-Feuilles adultes:

-Orbiculaire, quinquelobée, bullée , à point pétiolaire et nervures principales rouges.

- Sinus pétiolaire en lyre.

-Dessus de la feuille glabre.

-Dessous: duveteux blanc, nervures saillantes jusqu'en III, rougeâtres aranéeuses.

-Sinus latéral supérieur en U

-Sinus latéral inférieur marqué en U.

-Dentures :ogivales

-Sarments : couleur herbacée, légèrement rougeâtre .

-GRAPPE : moyenne allongée, cylindrique.

-Rouge léger en couleur aromatique et souple



Courbu Noir



Bourgeonnement
rouge , Jeunes feuilles
bronzées

Cépage typique du
Jurançon . Fragile à
l'oïdium , à conduire
long . Grappes
petites degré pas trop
élevé et acidité faible.
Aromatique donne
des vins fins et légers



Feuille
quinquelobée,
sinus petiolaire
rouge, denté sur le
bord. Petites dents
à côtes rectilignes.
Poils couchés.

Le groupe du Crouchen

Cépage	Nom d'introduction en collection (Bordeaux ou Montpellier)	Provenance (département)
Blancard B	Cruchinette (Mtp)	(Fr 64)
	Palougue (Bdx)	Irouléguy (Fr 64)
	Pedauque (Bdx-Mtp)	Orthez (Fr 64)
Claverie B*	Claverie (Bdx)	Portet (Fr 64)
	Claverie (Mtp)	Gan (Fr 64)
	Clabarien (Mtp)	(Fr 64)
Claverie coulard B	Claverie coulard (Mtp)	Bellocq (Fr 64)
Crouchen B*	Clare Riesling (Mtp)	Merbein (Austral.)
	Crouchen blanc (Mtp)	Coll. Ravaz
	Cruchen blanc (Bdx)	Messanges (Fr 40)
	Messanges blanc (Mtp)	Messanges (Fr 40)
Cruchen faux B	Cruchen faux (Mtp)	Lembeye (FR 64)
Cruixen B	Cruixen (Mtp)	Coll. Saumur
Graisse B*	Graisse (Bdx-Mtp)	Coll. Bordeaux (??)
	Gras (Mtp)	Coll. Ravaz
	Chalosse blanche (Mtp)	Coll. Ravaz
	Ramassaou blanc (Mtp)	Coll. Ravaz

CRUCHEN Blanc

Origine : Tisnerat à Lasseube.

Bourgeonnement : moyen,
cotonneux assez fort.

Jeunes feuilles du haut :

légèrement cuivrée, en gouttière.
Irrégulières.

Jeunes feuilles du bas :

aranéuses , bronzées




Feuilles adultes : orbiculaire,
quinquelobée. Points petiolaires et
début de nervures principales
marquées de rouge.

Le sinus petiolaire est en U fermé .

Les dents sont courtes a moyennes a
coté convexe ou rectiligne; face
inferieure faible densité de poils
couchés.

Virilles longues

Grappes de dimensions moyennes
avec des baies elliptiques et petites
et croquantes .



Réalisation de vins secs , élégants aromatiques .

Secteur : Lasseube (64) Messanges, Vieux
Boucau (40)Zarauzt, Azpeitia (Navarre)

TROUCHET Noir (Crouchen nere ?)

Lacoste-Negri Monein : 2/10/87.

Bourgeonnement :

FEUILLE : petite, orbiculaire, quinquelobée.

Face supérieure glabre, inférieure aranéeuse et également sur nervures principales.

Sinus pétiolaire en lyre ouverte.

Sinus latéraux inférieurs et supérieurs en doigt de gant, avec parfois une dent au fond du sinus.

Pédoncule court et vert.

Dents nombreuses et fines, aiguës, à bord latéral rectiligne.

Entre-nœuds de sarments : courts.

GRAPPE: Cylindrique ou conique , à pédoncule court et vert. Compacte, à baies grosses et ovoïdes, de coloration rouge marquée, pruinées, saveur herbacée en fin de bouches.

Port dressé



Claverien =
enclavée.
Clabertia

Claverie B

Bourgeons: forte densité de poils couchés. Léger liseré rose.


Feuilles entières, pleine, sinus petiolaire fermé et bords chevauchants lyre fermée.

Sinus lateraux peu marqués.

Nervures blanches très marquées, pilosité très marquée.

Grappes baies moyennes, grandes, de forme elliptique.

Autrefois de très forte implantation sur tout la zone A.O.C, il a fallu convaincre les vignerons à l'abandonner. Il avait l'objet de la création d'un vin sec « l'océan » en vin de pays



CRUCHEN NEGRE

Saba Gan



Doleris pensait qu'il y avait confusion avec un autre plant. Levadoux pense qu'il désigne le Morenoa du Pays basque

Ou Trouchet rouge pas encore bien défini

DOURECH (Erremachaoua, Ondenc rouge)

Mondinat Rg 18 depuis le figuier P5.

Bourgeonnement : petit, cotonneux, blanc, très rares plages rosées.

Jeune Feuille

- du haut, légèrement en gouttière.

- du bas : surface plane

dessus : légèrement aranéeux.

dessous : duveteux blanc

Feuille Adulte: petite à surface plane, quinquelobée.

Sinus en U ou à bord recouvrant.

Sinus latéral supérieur en U.

Sinus latéral inférieur en massue.

Dessus : point pétiolaire rouge, très légèrement aranéeux, nervures vertes.


Dessous : limbe aranéeux, duveteux, nervures saillantes, 1 et 2, poils dressés sur nervures d'ordre I et II.

Pétiole court, aranéeux, de couleur rouge, de grosseur moyenne.

GRAPPES : tronconiques, demi-laches, à pédoncule court.

Baies ovoïdes, régulières, à peau pruinée, de tailles moyennes, peau fine et chair juteuse.

Port général : demi dressé.



MANSENG NOIR

Barneix

Mondinat RG: 14 P: 7 depuis figuier.

BOURGEONNEMENT : petit , cotonneux blanc, liseré rose, plages roses.

JEUNES FEUILLES :

- du haut : dessus cotonneux, jaunâtre, à plages roses, disposées sur une seule moitié du limbe à liseré rose. Forme gouttière..

- Du bas : étalées , légèrement en gouttière.

- Dessus : aranéeux, bronzé.
- Dessous cotonneux-duveteux, a plages rosées.

FEUILLES ADULTES : orbiculaires de taille moyenne, quinquelobée, révolutée, révolutée, a fines bullures, dessus glabre.

Dessous aranéeux, sur le limbe : nervures I et II, saillantes et aranéeuses.

Sinus pétiolaire à bords parallèles ou recouvrant.

Sinus Latéral supérieur en U.

Sinus latéral inférieur en massue.

Dents moyennes, peu nombreuses, à bords rectilignes.

GRAPPE : conique ailée , serrée jeune et plus lâche en vieillissant . Lourde .

Baie: Noir foncée , riche en couleur , jus noir type tannat . Intéressantes dans les aromes.



Le groupe du Camaraou noir

Cépage	Nom d'introduction en collection (Bordeaux, Montpellier ou Entav)	Provenance (département)
Arrouya N	Arrouya (Mtp)	Gan (Fr 64)
	Eremachaoua (Bdx-Mtp)	St-Etienne-de-Baïgorry (Fr 64)
	Rouja (Mtp)	Lasseube (Fr 64)
Camaralet de Lasseube B*	Camaralet de Lasseube (Mtp)	Lasseube (Fr 64)
Camaraou blanc B	Camaraou blanc (Mtp)	Jurançon (Fr 64)
Camaraou femelle B	Camaraou blanc (Mtp)	Chapelle-de-Rousse (Fr 64)
Camaraou noir N	Camaraou noir (Mtp)	Monein (Fr 64)
Penouille N	Camaralet (Entav)	Saint-Mont (Fr 32)
	Penouille (Mtp)	(Fr 33)

ARROUYA

Noir

ARROUYA Photo 2 Betsimé

grappe mûre moyenne (25 cm)
à pedicelle herbacé pedicellément arqué
sans nœud auxiliaire,
pennées ramifications axillaires
à corps simple conique, aile à 2
lobes, compact

Baies mûres, ellipsoïdes, à section irrégulière,
petites.

Jus incolore, sans sucre, pulpe
juteuse, pellicule fine, fine, fine,

couleur noire avec faune, coloration
régulière.
résistance du pédicelle moyen.
à péricarpe court.

Sarment séché, à écorce adhérente, à
nœuds moyens, nœuds épais
yeux groupés, villys intermittents.
cordon pédonculaire fin, glabre, saillant
subtyle perpendiculaire

nœuds glabres, coloration marron à
rayons croisés, nœud plus fin



Camaraou Rouge

10/07/87

Saba-Assat Gan RG 12 P 3

Bourgeonnement moyen cotonneux blanc.

Jeunes feuilles étalées duveteux en surface ; cotonneux blanc face inférieur.

Feuilles adultes : Tri à quinquelobée, coloration verte jaunâtre, pétiole court, sinus pétiolaire en U.

Sinus latéral inférieur et supérieur en doigt de gant. bullures grossières. Face inférieure aranéuse.

Nervures saillantes jusqu'à ordre 3.

Pétiole rougeâtre.

Sarments verts à rougeâtres, entrenœud de dimension moyenne.

Grappes : moyennes , quelques fois ailées. Il donne des vins de petit degré et faibles en acidité



PB

Camaralet Noir

Bertranine Lasseube 06/82.

Bourgeonnement moyennement cotonneux blanc.

Jeune feuille étalée, cotonneuse sur la face supérieure et inférieure.

Forme très quinquelobée dès la jeune feuille.

Feuille Adulte orbiculaire, puis quinquelobée.

Sinus latéral inférieur et supérieur très marqué.

Sinus latéral inférieur à bord recouvert

Sinus latéral supérieur en doigt de gant

Limbe face supérieur : glabre.

Face inférieure aranéuse.

Sinus pétiolaire en lyre et dégarni.


Jeunes nervures près du point pétiolaire : légèrement rougeâtre.

Dentition irrégulière et aigue.

Sarment vert à entre-nœuds moyens

Grappe : lâche , (coulure fréquente).

Baies : assez grosses et croquantes. 3^{ie} époque



Le Camaralet

Caractéristiques du Camaralet de Lasseube B

Ampélographiques*

Culturales

Bourgeonnement* :	Cotonneux* blanc.
Jeune feuille :	Duveteuse*, à plages bronzées.
Feuille adulte :	A 5 lobes. Sinus pétiolaire* ouvert. Face inférieure du limbe avec une densité moyenne de poils dressés et des poils couchés.
Baies :	Petites., rondes
Grappes :	Petites, très lâches.
Flours :	Femelles.



Précocité :	Débourrement : 9 jours après le Chasselas. Maturité : 2 ^{ème} époque, 3 semaines après le Chasselas.
Production :	Variable selon la coulure.
Sensibilités aux maladies :	Sensible au botrytis, si forte production
Observations :	Risques de coulure très importants.



Camaralet blanc de Lasseube
site: De Nays à Jurançon. Photo: Blasco

Degrés de 12
à 16 suivant
l'année.

Acidité = 4.5

11/11/2017

Vins
aromatiques
fruits
exotiques ou
anisés

Cépages non classés

AHUMAT

Rosé

Lacoste-Negri Monein

Port : retombant

Feuilles : Orbiculaires, trilobées a bord recouvrant.

Dessus et dessous : glabre ,
pédoncule moyen.

Sinus pétiolaire en lyre.

Dents : nombreuses et aigues, a bord rectiligne.

Grappes : Cylindriques , ou coniques a long pédoncule. Grappe parfois ailé.

Baies : petites rondes, pruinées, ombliques.

Saveur : très fine, légèrement musquée.



Bazailacq 1987

Lercat *arqué, en arceau*



Cépage rare , secteur
Jurançon (Gan) très
performant
rendement et degré
Poids de 100 grains =
120 grs.
Degré 15° acidité =5



Bourgeonnement
Blanc, avec un petit
liseré carminé
Feuilles adultes : sinus
petiolaire en V a bord
recouvrant. Dents peu
nombreuses mais
grandes.
Sinus latéraux assez
profonds

Grappes moyennes à
grandes , baies
rondes peau solide .
Donc résistant au
botrytis



Petit
Manseng -
Savagnin



Merci de votre attention